



用藥指導-Zithromax (日舒)懸液用粉

商品名：Zithromax

中文名：日舒 懸液用粉

成分含量：每 c.c. 含Azithromycin 40 mg，每瓶 15 c.c.

作用：廣效性抗生素，用於治療下呼吸道的感染包括支氣管炎及肺炎、皮膚及軟組織的感染、中耳炎、上呼吸道感染等。

用法與劑量

- 一天 1 次，劑量依小朋友的年齡、體重而異，請遵照醫師處方及藥袋上的指示量服用。若出現胃部不適，請與食物併服。
- 與食物一起服用會減少藥效，應空腹服用，可於飯前 1 小時或飯後 2 小時服用。

藥品存放方式

- 泡製為懸浮液後，最好放在冰箱內冷藏保存，室溫 30 °C 以下可保存 10 天。
- 請存放於孩童拿不到之處。

可能的不良反應

- 噁心、嘔吐、腹痛、消化不良、食道炎、口咽潰爛、胃炎、肌肉骨骼酸痛、高血鈣症、多尿、劇渴、虛弱、嗜睡。
- 過敏反應如蕁麻疹、皮膚癢、皮疹、血管淋巴水腫等。

特別用藥指示

- 泡製方式：輕拍藥瓶使瓶內粉末鬆散，加入 9 c.c.冷開水後立即搖動以溶解藥粉，可泡製成 15 c.c.的藥水，藥盒內附 5c.c.的針筒，方便您抽取水量。
- 泡製後，每次使用前請先搖勻，再倒出所需服用之藥量。

- 請務必依照醫師指示服用足夠的藥量，並完成整個療程，切勿擅自停藥或自行更改藥量，以免造成細菌抗藥性的問題。
- 請勿將藥品與其他人分享。
- 若需與制酸劑同時併服，應錯開 2 小時服用，先服用日舒再使用制酸劑，不要同時服用以免影響藥效。
- 服藥期間會增加對陽光的敏感，應避免長時間暴曬陽光。

若有任何疑問，請不吝與我們聯絡
電話：(04) 22052121 分機3154, 5126