



核醫腸胃道出血掃描

經過臨床醫師的評估、懷疑或確認您患有炎症或腫瘤的問題，因此為您安排了核醫鎩-67 發炎或腫瘤掃描，希望透過下面的介紹，能讓您對核醫鎩-67 發炎或腫瘤掃描有進一步的了解。

檢查方式

- 檢查前，先禁食 4 小時以上。
- 檢查時，先接受製備核醫標記紅血球的準備(須抽血)。
- 在等候椅等待技術師的通知。
- 至核醫掃描室注射核醫標記紅血球，注射後 5、15、30、45、60 分鐘後進行腹部造影。若仍未找到出血點，可每 30 至 60 分鐘再造影一次，直到找到出血點或由醫師決定結束檢查，再於懷疑出血時機另行檢查。

注意方式

- 若您有懷孕的可能或在 48 小時內曾接受過鋇劑放射線造影，暫時不宜進行核醫腸胃道出血掃描，請先告知。
- 接受核醫腸胃道出血掃描時，須在造影前先解小便，而且在攝影過程中儘量不動，如此可以提高影像的品質。其它則無特別之注意事項，並且罕見有過敏等副作用。

若有任何疑問，請不吝與我們聯絡
電話：(04) 22052121 分機7401、7410
HE-T2034