



中國醫藥大學附設醫院  
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地 址：台中市育德路 2 號

電 話：(04)22052121-3154

# 藥 劑 快 訊

## 本期目次

### 1. 藥品異動資訊 (P1)

- (1) 臨時採購
- (2) 更換廠牌
- (3) 包裝異動
- (4) 暫時替代

### 2. 預防用藥疏失--易混淆/形音相似藥品 (P9)


同成分不同劑量

### 3. 藥物安全警訊 (P10)

SGLT2 抑制劑類成分藥品安全資訊

# 1. 藥品異動資訊


## (1) 臨時採購

日期	107.10.04	
學名/規格	Ixekizumab 80mg/Syringe	
商品名	Taltz 達癬治注射劑	
適應症	斑塊性乾癬、乾癬性關節炎	
備註	內科部臨採	

日期	107.10.23	
學名/規格	Guselkumab 100mg/Syringe	
商品名	Tremfya 特諾雅注射液	
適應症	適用於治療適合接受全身性治療或光療法的中至重度斑塊性乾癬成人病人	
備註	皮膚科臨採	

日期	107.10.24	
學名/規格	Dactinomycin 0.5mg/Vial	
商品名	Dactilon	
適應症	Ewing's sarcoma of bone, Gestational trophoblastic neoplasia, Metastatic malignant tumor of testis, nonseminomatous, Nephroblastoma, Rhabdomyosarcoma, Solid tumor, Locally recurrent or locoregional solid malignancies, with palliative or adjunctive regional perfusion	
備註	專案進口藥品	

## (2) 更換廠牌

日期	107.10.01	變更項目	由默沙東廠換為信東廠
對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Levodopa 100 mg Carbidopa 25 mg	Levodopa 250 mg Carbidopa 25 mg	
商品名	Sinemet 心寧美錠	Bidopar 拜渡帕錠	
適應症	帕金森氏症及綜合病徵		
備註	Levodopar 劑量不同請注意		

### (3) 包裝異動

日期	107.10.02	變更項目	包裝加中文名
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Ivermectin 3mg/Tab		
商品名	Stromectol 絲每妥錠		
適應症	適用於治療已在臨床上及/或寄生蟲檢查中確立診斷的疥瘡		
備註	皮膚科臨採		


日期	107.10.04	變更項目	外盒包裝變更
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Acetylcysteine 5 g/25 ml/Vial		
商品名	Hidonac 希那克注射劑		
適應症	蓄意或偶發之 PARACETAMOL 中毒之解毒劑		

日期	107.10.08	變更項目	鋁箔包裝印字變更
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名規格	L-Carnitine 1g/Tab		
商品名	L-Carnitene 加力體能咀嚼錠		
適應症	用於先天遺傳性代謝異常的續發性 CARNITINE 缺乏病患之急性慢性治療		

日期	107.10.09	變更項目	裸錠標記變更
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Silodosin 4mg/Tab		
商品名	Urief 優列扶膜衣錠		
適應症	前列腺肥大症所伴隨的排尿障礙		

日期	107.10.16	變更項目	塑膠瓶變更為軟袋
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Taita No.5 400mL/Bot		
商品名	Taita No.5 台大五號注射液		
適應症	手術前後及未能進食病人之水份、電解質、熱能補充、維持液		
易混淆品項	Taita No.1~No.4		

日期	107.10.16	變更項目	塑膠瓶變更為軟袋
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名規格	KCL 10meq in 台大 5 號 400mL/Bot		
商品名	KCL 10meq in 台大 5 號		
適應症	缺鉀狀態		
備註	TPN 配製藥品		

日期	107.10.19	變更項目	鋁箔包裝印字變更
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Sacubitril 49mg / Valsartan 51mg		
商品名	Entresto 健安心		
適應症	治療慢性心臟衰竭(紐約心臟學會[NYHA]第二級至第四級)且心室射出分率降低的患者，減少心血管死亡和心臟衰竭住院風險		
備註	由一排 10 顆變為一排 14 顆		
易混淆品項	Entresto 200 mg 健安心		

日期	107.10.19	變更項目	鋁箔包裝印字變更
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Bisoprolol Fumarate 1.25 mg/Tab		
商品名	Concor 康肯		
適應症	穩定型慢性中度至重度心衰竭		
易混淆品項	Bisoprolol 5mg 百適歐膜衣錠		

## (4) 暫時替代

日期	107.10.17	變更項目	由默沙東暫代為歐舒邁克
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Rocuronium 50mg/5mL		
商品名	安心麻儂注射劑	肌麻注射劑	
適應症	全身麻醉的輔佐藥，以幫助支氣管內插管及提供手術時骨骼肌肉鬆弛狀態		

## 2. 預防用藥疏失--混淆/形音相似藥

外觀相近，同成分/不同劑量

圖片



學名規格	nintedanib ethanesulfonate 150mg/Cap	nintedanib ethanesulfonate 100mg/Cap
中文商品名	抑肺纖軟膠囊	抑肺纖軟膠囊
商品名	Ofev 150mg/Cap	Ofev 100mg/Cap

# 3. 藥物安全警訊

## TFDA 安全警訊摘要與本院現況

### 1. SGLT2 抑制劑類成分藥品安全資訊

2018/8/29 美國 FDA 發布有關使用 SGLT2 抑制劑類藥品治療糖尿病，曾發生生殖器區域出現罕見但嚴重之感染之安全性資訊。

1. 美國 FDA 發布警訊指出，曾有使用第二型糖尿病用藥 SGLT2 抑制劑類藥品後發生生殖器與其周圍出現罕見但嚴重之感染的案例報告，此感染稱為會陰部壞死性筋膜炎(necrotizing fasciitis of the perineum)，亦稱為弗尼爾氏壞疽(Fournier's gangrene)。因此美國 FDA 將於所有含 SGLT2 抑制劑類藥品仿單中加註相關風險。
2. Fournier's gangrene 是一種極罕見但可能危及生命的細菌性感染，會延及會陰部周圍皮膚下組織包括：肌肉、神經、脂肪和血管。細菌通常會經由皮膚的切口或破裂處進入體內，迅速擴散並破壞其感染的組織。患有糖尿病雖是發生 Fournier's gangrene 的危險因子，然而於糖尿病病人中仍屬罕見。
3. 美國 FDA 發現在 2013 年 3 月至 2018 年 5 月期間，有 12 例 Fournier's gangrene 的案例是使用 SGLT2 抑制劑類藥品的病人。雖然過去文獻報告中大多數 Fournier's gangrene 的案例為男性，但美國 FDA 接獲的 12 例案例報告中包含 7 位男性與 5 位女性。案例中 Fournier's gangrene 發生於病人開始使用 SGLT2 抑制劑類藥品後數個月。12 位病人均需住院且需接受手術治療，其中有些病人需接受多次外觀手術，部分病人出現併發症，而 1 位病人死亡。

### 醫療人員應注意事項

1. 曾有第二型糖尿病病人使用 SGLT2 抑制劑類藥品後發生會陰部壞死性筋膜炎(亦稱為 Fournier's gangrene)的案例報告，這是一種可能危及生命的感染症，須緊急使用抗生素並進行外科清創手術治療。在這些案例報告中女性與男性

出現的頻率幾乎相等，而其感染後的嚴重結果包含住院、需進行多次外科手術與死亡。

2. 當病人的生殖器或會陰部出現壓痛、發紅、腫脹，伴隨發燒、無力，且有明顯的疼痛，應評估病人是否發生 Fournier's gangrene。
3. 若懷疑發生 Fournier's gangrene，應立即使用廣效性抗生素治療，如有必要應進行外科清創手術。應停用 SGLT2 抑制劑類藥品，密切監測血糖值並提供合適的替代療法來控制血糖。
4. 應告知病人若生殖器或會陰部出現任何壓痛、發紅、腫脹，伴隨發燒或無力，請立即尋求醫療協助。

### 本院現況與民眾應注意事項

1. 本院現有含 SGLT2 抑制劑類藥品品項包含：

醫令代碼	商品名	學名	中文名
TDAPAGL	Forxiga 10mg/Tab	Dapagliflozin 10mg/Tab	福適佳膜衣錠
TXIGDUO	Xigduo XR 10/1000mg /Tab	Xigduo XR 10/1000mg /Tab	釋多糖持續性藥效膜衣錠
TEMPAG1	Jardiance 10mg/Tab	Empagliflozin 10mg/Tab	恩排糖膜衣錠
TJARDI8	Jardiance Duo 12.5/850 mg/Tab	Jardiance Duo 12.5/850 mg/Tab	恩美糖膜衣錠

2. 曾有使用第二型糖尿病用藥 SGLT2 抑制劑類藥品後發生生殖器與其周圍出現罕見但嚴重之感染的案例報告，此稱為會陰部壞死性筋膜炎，亦稱為弗尼爾氏壞疽，這種感染進展迅速，會對生殖器周圍組織造成嚴重損害，因此必須立即治療。
3. 若於服用 SGLT2 抑制劑類藥品後，您的生殖器或生殖器到直腸區域出現任何壓痛、發紅、腫脹，伴隨發燒超過 38°C 或感覺不適，請立即尋求醫療協助，因為這些症狀可能迅速惡化。
4. SGLT2 抑制劑類藥品亦可能會造成局部的生殖器黴菌感染，亦稱為酵母菌感染。酵母菌感染不同於弗尼爾氏壞疽，因其只會導致有限的局部性症狀，如陰道或陰莖分泌物增多、搔癢或發紅，並不會伴隨發燒或全身不適的感覺。

若有任何疑問請諮詢醫療人員，切勿自行停用糖尿病用藥。若糖尿病未接受治療，可能會導致嚴重的問題，包括失明、神經及腎臟損傷與心臟疾病等。